

Przygotowanie do zabiegu w znieczuleniu miejscowym

Wskazówki dotyczące szczepienia p/ko WZW typ B:

Schemat szczepień dla osób nieszczepionych na żółtaczkę zakaźną typu B:

- Pierwsze szczepienie na 6 tygodni przed zabiegiem
- Drugie szczepienie na 2 tygodnie przed zabiegiem
- Trzecie szczepienie przypominające po 6mcach

Trzecie szczepienie wykonuje się już po zabiegu, ale warto, ponieważ osoby, które zostały zaszczepione 3 dawkami szczepionki p/WZWtypB zgodnie ze schematem, są odporne na całe życie i nie muszą powtarzać szczepień, ani wykonywać szczepień przypominających.

Szczepienie przeciw WZW typ B wykonuje się u Lekarza POZ. Brak szczepień na WZW typ B nie wyklucza zabiegu, jednak odbywa się on na odpowiedzialność pacjenta.

Adnotację o przebytych szczepieniach należy przynieść na zabieg.

Badania do zabiegu w znieczuleniu miejscowym

Do niektórych zabiegów wykonywanych w znieczuleniu miejscowym zaleca się wykonanie badań:

1. Grupa krwi
2. Badania krwi (nie starsze, niż 1 mc)
 - morfologia krwi
 - układ krzepnięcia
 - antygen HBS
 - przeciwciała anty-HCV

(+inne badania zlecone indywidualnie przez operatora)

Jeśli zostały zlecone badania krwi należy je wykonać i wysłać wyniki smsem 605 245 217 lub mailem: maks.plast@wp.pl

Zakazane leki i parafarmaceutyki:

Na **2 tygodnie** przed zabiegiem **nie wolno** przyjmować:

- **Aspiryna, Polopiryna**
- **Acard, Polocard**
- Nurofen, Ibuprofen, Ibuprom
- Diklofenak, Voltaren
- Preparaty złożone zawierające kwas acetylosalicylowy
- Inne leki hamujące krzepliwość krwi
- Witamina E i inne witaminy, suplementy, mikroelementy
- Olej z wiesiołka, Oeparol, Olej z wątroby rekina, kwasy Omega-3
- Preparaty z żeńszem, skrzypem (np. Skrzypovita)
- Czosnek, imbir, chili
- **UWAGA:** Osoby zażywające retinoidy doustnie powinny odstawić je na minimum 3 –6 mce przed zabiegiem.

UWAGA: Osoby zażywające środki hamujące krzepliwość krwi (Acard, Polocard, antykoagulanty, i inne), u których rodzaj schorzenia nie pozwala na ich odstawienie, winny skontaktować się ze swoim Lekarzem Prowadzącym w celu zmiany w/w leków na iniekcje heparyny niskocząsteczkowej.

Postępowanie w dniu zabiegu

1. Przyjeżdżamy do Kliniki po lekkim posiłku. Można go spożyć na 1-2 godziny przed zabiegiem. Wodę pijemy bez ograniczeń.
Leki, uzgodnione z operatorem, zażywamy jak zwykle.

2. **Biżuterię** zostawiamy w domu.

3. Przed przyjazdem zmywamy **makijaż (jeśli zabieg na twarzy)**.

UWAGA: Należy usunąć sztuczne rzęsy w przypadku operacji powiek.

4. Pakujemy przed zabiegiem:
 - a. Dowód tożsamości
 - b. Wydrukowane wyniki badań, jeśli były zlecane.
 - c. Telefon i ładowarka
 - d. Aktualny paszport COVID

5. Po zabiegu opuszczamy klinikę **pod opieką osoby towarzyszącej!**
Nie wolno prowadzić auta zaraz po zabiegu!
(z wyjątkiem osób po małych zabiegach typu: wycięcie zmiany skórnej)