

## Zakazane leki

**Lista leków i parafarmaceutyków**, które są zakazane przed zabiegiem ze względu na zwiększone krwawienie w trakcie zabiegu, zwiększone ryzyko powstania krwiaka po zabiegu i niekorzystny wpływ na gojenie się ran.

**Na 2 tygodnie przed zabiegiem** nie wolno przyjmować:

- **Aspiryna, Polopiryna**
- **Acard, Polocard**
- Nurofen, Ibuprofen, Ibuprom
- Diklofenak, Voltaren
- Preparaty złożone zawierające kwas acetosalicylowy typu Cholinex
- Inne antykoagulanty i lekarstwa hamujące krzepliwość krwi
- Witamina E i inne witaminy ( oprócz wit. C ), suplementy, mikroelementy
- Olej z wiesiołka, Oeparol, Olej z wątroby rekina, kwasy Omega-3
- Preparaty z żeńszeniem, skrzypem (np. Skrzypovita)
- Czosnek, imbir, chili
- **UWAGA:** Osoby zażywające retinoidy doustnie powinny odstawić je na minimum 3 –6 mce przed zabiegiem.

**UWAGA:** Osoby zażywające środki hamujące krzepliwość krwi ( Acard, Polocard, antykoagulanty, i inne), u których rodzaj schorzenia nie pozwala na ich odstawienie, winny skontaktować się ze swoim Lekarzem Prowadzącym w celu zmiany w/w leków na heparynę niskocząsteczkową.